



Arbosana

Sinonimias

Origen: España.

Destino: Aceite.

Consideraciones agronómicas y comerciales

Es una variedad de porte reducido y alta productividad adecuada para plantaciones en setos, teniendo una buena adaptación a plantaciones superintensivas. Tiene buena capacidad de enraizamiento.

Productividad muy similar o incluso superior a la variedad Arbequina y de aceite más estable.

Su entrada en producción es muy precoz. Su época de floración es tardía.

Su época de maduración es media (se cosecha tres semanas después que la variedad Arbequina), sus frutos presentan alta resistencia al desprendimiento, por lo que dificulta la recolección mecanizada.

Se considera muy resistente al repilo y tolera bien verticillium y mosca. Resiste peor la sequía que la variedad Arbequina, sin embargo se recupera bien de las lluvias otoñales. Tiene escasa resistencia al frío y es sensible a tuberculosis.

Caracteres morfológicos



ÁRBOL	
VIGOR:	Bajo
PORTE:	Abierto
DENSIDAD DE COPA:	Alta



HOJA	
FORMA:	Elíptico-lanceolada
LONGITUD:	Corta
ANCHURA:	Estrecha



FRUTO	
PESO:	Bajo
FORMA:	Esférica
SIMETRÍA:	Ligeramente asimétrica
ÁPICE:	Redondeado
BASE:	Redondeada
PEZÓN:	Ausente
LENTICELAS:	Abundantes y pequeñas

Exocarpo (epicarpio; piel: epidermis + cutícula)



Mesocarpo (pulpa) **Endocarpo** (hueso, carozo)

ENDOCARPO	
PESO:	Bajo
FORMA:	Ovoidal
SIMETRÍA:	Asimétrico
ÁPICE:	Redondeado