



Carrasqueño de la Sierra

Sinonimias

Carrasqueño

Origen: España.

Destino: Aceite.

Consideraciones agronómicas y comerciales

Varietal poco rústica pues sufre con los inviernos fríos y la sequía, aunque parece tolerancia a la caliza. Su capacidad de enraizamiento por estaquillado semileñoso es elevada. La entrada en producción es media.

Época de floración entre media y tardía. La época de maduración de sus frutos es tardía. Productividad media y constante. La elevada fuerza de retención de los frutos dificulta su recolección mecanizada. **Tiene doble aptitud aunque su destino principalmente es para aceite**, considerándosele de bajo contenido graso.

Parece ser sensible a tuberculosis y repilo.

Caracteres morfológicos



ÁRBOL	
VIGOR:	Medio
PORTE:	Abierto
DENSIDAD DE COPA:	Espesa



INFLORESCENCIA	
LONGITUD:	Larga
NÚMERO DE FLORES:	Medio



HOJA	
FORMA:	Elíptico-lanceolada
LONGITUD:	Media
ANCHURA:	Media
CURVATURA LONGITUDINAL DEL LIMBO:	Plana



FRUTO	
PESO:	Medio-elevado
FORMA:	Ovoidal
SIMETRÍA:	Asimétrico
POSICIÓN DEL DIÁMETRO TRANSVERSAL MÁXIMO:	Centrada
ÁPICE:	Redondeado
BASE:	Truncada
PEZÓN:	Presente o ausente
LENTICELAS:	Abundantes y pequeñas



ENDOCARPO	
PESO:	Medio
FORMA:	Elíptica
SIMETRÍA:	Ligeramente asimétrico
POSICIÓN DEL DIÁMETRO TRANSVERSAL MÁXIMO:	Centrada
ÁPICE:	Apuntado
BASE:	Apuntada
SUPERFICIE:	Lisa
NÚMERO DE SURCOS FIBROVASCULARES:	Medio
TERMINACIÓN DEL ÁPICE:	Con mucrón