



# Cornicabra

## Sinonimias

Cabrilla, Común, Cornal, Cornatillo, Corneja, Cornetilla, Cornezuelo, Cornicabra Basta, Cornicabra Negra, Corniche, Cornita, Corriente, Cuernecillo, de Aceite, de Piquillo, del Terreno, Longar, Longuera, Osnal.

**Origen:** España.

**Destino:** Aceite.

## Consideraciones agronómicas y comerciales

Variedad de fácil enraizamiento y gran adaptación a suelos pobres y zonas secas y frías.

Su entrada en producción es tardía.

Su época de floración es tardía y, aunque suele tener un elevado aborto ovárico, asegura un cuajado suficiente en autopolinización. Su polen presenta baja germinabilidad.

La productividad es elevada y alternante.

La maduración de sus frutos es tardía y presentan elevada resistencia al desprendimiento, lo que dificulta su recolección mecanizada.

Es apreciada por su elevado rendimiento graso y por la calidad de su aceite, de excelente características organolépticas y elevada estabilidad. También es utilizada para aderezo por la calidad de su pulpa.

Es especialmente sensible a tuberculosis, verticilosis y repilo. También es sensible a los ataques de mosca.

### Caracteres morfológicos



ÁRBOL	
VIGOR:	Medio
PORTE:	Erguido
DENSIDAD DE COPA:	Espesa



INFLORESCENCIA	
LONGITUD:	Media
NÚMERO DE FLORES:	Bajo



HOJA	
FORMA:	Elíptico-lanceolada
LONGITUD:	Media
ANCHURA:	Media
CURVATURA LONGITUDINAL DEL LIMBO:	Plana



FRUTO	
PESO:	Medio
FORMA:	Alargada
SIMETRÍA:	Asimétrico
POSICIÓN DEL DIÁMETRO TRANSVERSAL MÁXIMO:	Centrada
ÁPICE:	Apuntado
BASE:	Truncada
PEZÓN:	Ausente
LENTICELAS:	Abundantes y pequeñas

**Exocarpo** (epicarpio; piel: epidermis + cutícula)



**Mesocarpo** (pulpa)  
**Endocarpo** (hueso, carozo)

<b>ENDOCARPO</b>	
PESO:	Medio
FORMA:	Alargada
SIMETRÍA:	Asimétrico
POSICIÓN DEL DIÁMETRO TRANSVERSAL MÁXIMO:	Centrada
ÁPICE:	Apuntado
BASE:	Apuntada
SUPERFICIE:	Rugosa
NÚMERO DE SURCOS FIBROVASCULARES:	Medio
TERMINACIÓN DEL ÁPICE:	Sin mucrón