



Manzanilla Cacereña

Sinonimias

Albareña, Alvellanilla, Asperilla, Blanca Cacereña, Cacereña, Costalera, Hembra, Manzanil, Manzanilla, Morillo, Negrilla, Perito, Redonda, Redondilla y Turiel, en España; Azeitera, Azeitonera y Negrinha, en Portugal.

Origen: España y Portugal.

Destino: Doble aptitud.

Consideraciones agronómicas y comerciales

Variedad poco vigorosa, de buena adaptación a suelos pobres y al frío invernal.

Su capacidad de enraizamiento es muy elevada.

Entrada en producción precoz. Su época de floración es temprana y es considerada autocompatible y de bajo porcentaje de aborto ovárico. De productividad elevada y constante.

La maduración de sus frutos es precoz y presenta baja fuerza de retención, que facilita su recolección mecanizada.

Es muy apreciada para su aderezo, tanto en verde como en negro, por la calidad de su pulpa. Su contenido en aceite es bajo, aunque de calidad. La separación de la pulpa del hueso es fácil.

Es susceptible a verticilosis y tolerante a la mosca y tuberculosis.

Caracteres morfológicos



ÁRBOL	
VIGOR:	Bajo
PORTE:	Abierto
DENSIDAD DE COPA:	Media



INFLORESCENCIA	
LONGITUD:	Media
NÚMERO DE FLORES:	Medio



HOJA	
FORMA:	Elíptico-lanceolada
LONGITUD:	Media
ANCHURA:	Media
CURVATURA LONGITUDINAL DEL LIMBO:	Plana



FRUTO	
PESO:	Elevado
FORMA:	Esférica
SIMETRÍA:	Ligeramente asimétrico
POSICIÓN DEL DIÁMETRO TRANSVERSAL MÁXIMO:	Centrada hacia la base
ÁPICE:	Redondeado
BASE:	Truncada
PEZÓN:	Ausente
LENTICELAS:	Abundantes y pequeñas

Exocarpo (epicarpio; piel: epidermis + cutícula)



Mesocarpo (pulpa)
Endocarpo (hueso, carozo)

ENDOCARPO	
PESO:	Medio
FORMA:	Elíptica
SIMETRÍA:	Ligeramente asimétrico
POSICIÓN DEL DIÁMETRO TRANSVERSAL MÁXIMO:	Centrada
ÁPICE:	Redondeado
BASE:	Apuntada
SUPERFICIE:	Rugosa
NÚMERO DE SURCOS FIBROVASCULARES:	Medio
TERMINACIÓN DEL ÁPICE:	Con mucrón