



Picual

Sinonimias:

Andaluza, Blanco, Corriente, de aceite, de Calidad, Fina, Jabata, Lopereño, Marteño, Morcona, Nevadillo, Nevadillo Blanco, Picúa, Salgar, Temprana.

Origen: España.

Destino: Aceite.

Consideraciones agronómicas y comerciales

Es la variedad más importante y extendida en España. Su difusión geográfica está ligada a Andalucía, principal región productora del mundo y en concreto, a las provincias de Jaén, Córdoba y Granada. También está presente en Málaga, Ciudad Real y Badajoz.

La aceituna es de tamaño medio a grande, con 3,2 gramos de promedio. La relación carne-hueso es de 5:6. La maduración se produce de principio de noviembre a mitad de diciembre. La productividad de aceite es alta, llegando hasta un 27,7%, aunque el promedio es de alrededor de 22%.

Es una variedad rustica por su adaptación a diversas condiciones de clima y suelo; en particular se estima tolerante al frío, a la salinidad y al exceso de humedad en el suelo. Sin embargo, es sensible a la sequía y a terrenos calizos.

La entrada en producción es precoz. Su época de floración es media y se considera autocompatible. La maduración de sus frutos es precoz y presenta una baja resistencia al desprendimiento, que facilita la recolección mecanizada de los mismo.

Es muy apreciada por su constante y elevada productividad, rendimiento graso elevado y facilidad de cultivo. Su aceite es de calidad media, aunque destaca por un alto índice de estabilidad, que implica una gran resistencia al enranciamiento, y por un porcentaje en ácido oleico muy elevado.

Es una variedad tolerante a tuberculosis y lepra, pero muy susceptible a repilo y verticilosis. También es susceptible a la mosca.

El árbol presenta un gran vigor, de ramas algo cortas, ramificadas con tendencia a producir brotes y chupones. Sus copas son vigorosas y tienden a cerrarse, con buen desarrollo foliáceo siendo la madera joven de color verde grisácea.

Caracteres morfológicos



ÁRBOL	
VIGOR:	Medio
PORTE:	Abierto
DENSIDAD DE COPA:	Espesa



INFLORESCENCIA	
LONGITUD:	Media
NÚMERO DE FLORES:	Bajo



HOJA	
FORMA:	Elíptico-lanceolada
LONGITUD:	Media
ANCHURA:	Media
CURVATURA LONGITUDINAL DEL LIMBO:	hiponastica



FRUTO	
PESO:	Medio
FORMA:	Ovoidal
SIMETRÍA:	Asimétrico
POSICIÓN DEL DIÁMETRO TRANSVERSAL MÁXIMO:	Centrada
ÁPICE:	Redondeado
BASE:	Truncada
PEZÓN:	Ausente
LENTICELAS:	Abundantes y pequeñas

Exocarpo (epicarpio; piel: epidermis + cutícula)



Mesocarpo (pulpa) **Endocarpo** (hueso, carozo)

ENDOCARPO	
PESO:	Elevado
FORMA:	Elíptica
SIMETRÍA:	Asimétrico
POSICIÓN DEL DIÁMETRO TRANSVERSAL MÁXIMO:	Centrada
ÁPICE:	Apuntado
BASE:	Redondeada
SUPERFICIE:	Escabrosa
NÚMERO DE SURCOS FIBROVASCULARES:	Medio
TERMINACIÓN DEL ÁPICE:	Con mucrón