

Verdial de Badajoz

Sinonimias

Macho, Manzanilla Rabuda, Mollar, Zorazaleño.

Origen: España.

Destino: Aceite.

Consideraciones agronómicas y comerciales

Variedad muy vigorosa, apreciada por su notable resistencia a la sequía, que la hace recomendable como patrón de variedades mas susceptibles.

Su capacidad de enraizamiento es media. Su capacidad de brotación tras podas severas es limitada.

Su entrada en producción es media.

Su época de floración es media y suele presentar elevados porcentajes de aborto ovárico.

Con una productividad media y alternante, su época de maduración es media y presenta una elevada resistencia al desprendimiento, que dificulta la recolección de sus frutos.

Variedad apreciada para aceite, por su elevado rendimiento graso, y para mesa, por su tamaño y facilidad de aderezo.

Se considera muy susceptible a tuberculosis y susceptible a lepra y mosca.



Caracteres morfológicos



ÁRBOL	
VIGOR:	Elevado
PORTE:	Erguido
DENSIDAD DE COPA:	Espesa



INFLORESCENCIA	
LONGITUD:	Larga
NÚMERO DE FLORES:	Medio



НОЈА	
FORMA:	Elíptico-lanceolada
LONGITUD:	Larga
ANCHURA:	Media
CURVATURA LONGITUDINAL DEL LIMBO:	Epinástica



FRUTO	
PESO:	Elevado
FORMA:	Ovoidal
SIMETRÍA:	Asimétrico
POSICIÓN DEL DIÁMETRO TRANSVERSAL MÁXIMO:	Centrada
ÁPICE:	Apuntado
BASE:	Truncada
PEZÓN:	Presente
LENTICELAS:	Abundantes y pequeñas



Exocarpo (epicarpio; piel: epidermis + cutícula)

Mesocarpo Endocarpo (hueso, carozo)

(pulpa)

ENDOCARPO	
PESO:	Elevado
FORMA:	Elíptica
SIMETRÍA:	Asimétrico
POSICIÓN DEL DIÁMETRO	Centrada
TRANSVERSAL MÁXIMO:	
ÁPICE:	Apuntado
BASE:	Apuntada
SUPERFICIE:	Rugosa
NÚMERO DE SURCOS	Alto
FIBROVASCULARES:	
TERMINACIÓN DEL ÁPICE:	Con mucrón

